



ODBORNÝ TÍM ORL

- 1 MUDr. Alena Staníková, PhD.
- 2 MUDr. Branislav Lorenc
- 3 MUDr. Lucia Bujnová
- 4 MUDr. Roman Stanik



ProCare Betliarska

Betliarska 17, 851 07 Bratislava-Petržalka

ORL ambulancie sa nachádzajú
na 2. poschodí polikliniky

ORDINAČNÉ HODINY ORL AMBULANCIE:

Pondelok: 07.30 - 15.45
Utorok: 07.30 - 15.45
Streda: 07.30 - 15.15
Štvrtok: 08.00 - 15.30
Piatok: 07.30 - 15.45



Dostupnosť
operačných
termínov



Široké
spektrum
zámkrov



Dlhoročná
prax
lekárov



Nadštandardné
prístrojové
vybavenie



RIEŠIME
VAŠE ŤAŽKOSTI



OBJEDNAJTE SA

0907 888 999
info@procare.sk

www.procare.sk

ORL DETSKÁ
VYHLADÁVANÁ
JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

 ProCare | Betliarska





LIEČEBNÉ VÝKONY

V oblasti detskej ORL ponúkame v ProCare Betliarska široké spektrum operačných výkonov, ktoré realizujeme v nadštandardne vybavených operačných sálach. Operácie detí vykonávame výlučne v celkovej anestézii. Pacienti sú po operačnom výkone v jednodňovej chirurgii prepustení v popoludňajších hodinách v deň operácie do domácej starostlivosti.

ENDOSKOPICKÁ ADENOIDEKTÓMIA

Odstránenie nosohltanovej mandle z dôvodu mechanickej prekážky alebo zdroja chronickej infekcie.

Príznaky:

- Časté infekcie horných dýchacích ciest
- Nočné chrápanie
- Dýchanie ústami
- Nosový hlas (rinolália)
- Nedoslýchavosť
- Opakované zápaly stredného ucha

TONZILEKTÓMIA

Odstránenie podnebných mandlí.

Príznaky:

- Opakované bakteriálne infekcie podnebných mandlí – tonzilitída – angína.

TONZILOTÓMIA

Zmenšenie objemu podnebných mandlí, ak sú veľkou mechanickou prekážkou v dutine ústnej. Vykonáva sa len pri zdravých podnebných mandliach. Často je výkon potrebný v kombinácii s endoskopickou adenoidektómiou.

Príznaky:

- Nočné chrápanie
- Apnoické pauzy (zástavy dychu) počas spánku
- Nekvalitný spánok
- Nosový hlas (rinolália)
- Poruchy reči
- Zhoršené prehĺtanie

FRENULOTÓMIA ALEBO FRENULOPLASTIKA

Ide o korekciu skrátenej podjazykovej uzdičky alebo uzdičky pod hornou perou.

Príznaky:

- Poruchy reči – najmä dyslália
- Narušený vývoj chrupu v hornom zuboradi



ZAVEDENIE STREDOUŠNÝCH VENTILAČNÝCH TRUBIČIEK (STIPÚL)

Pri tomto zákroku narežeme blanku bubienka a odsajeme tekutinu. Do vytvoreného otvoru následne vložíme malú plastovú alebo kovovú trubičku (stipulu), ktorá zabezpečí dlhodobú ventiláciu stredného ucha.

Príznaky:

- Nedoslýchavosť
- Opakované zápaly stredného ucha
- Nález tekutiny v strednom uchu

PLASTICKÁ OPERÁCIA ODSTÁVAJÚCICH UŠNÍC

Operačným výkonom upravujeme odstávajúce ušnice do správneho postavenia.

